




CLÉ DE DÉTERMINATION DES AMPHIBIENS N'AYANT PAS DE QUEUE À L'ÉTAT ADULTE (Anoures).



Glandes parotoïdes



L'animal a-t-il une pupille horizontale et un iris cuivré ?

oui


C'est un **crapaud commun**
Bufo bufo

non



L'animal porte-t-il des glandes parotoïdes (renflements) juste derrière l'œil et des verrues sur la peau ?

oui



C'est une espèce de **crapaud** non encore observée ici, merci de la photographier sous toutes ses faces.

non

L'animal a une peau lisse et la pupille est horizontale : **grenouille**.



ligne vertébrale claire

L'animal a-t-il une tache marron, en forme de masque derrière l'œil ?

oui

C'est une **grenouille rousse**
Rana temporaria

non

L'animal a une coloration verte parfois gris verdâtre ou brunâtre et présente une ligne vertébrale plus claire.

C'est une espèce de **grenouille verte**:
Rana esculenta-lessonae.

oui

L'animal a une coloration brune ou rousse, jamais verte.



oui

C'est un mâle, taille max 6,5 cm.

non

L'animal a-t-il des pelotes nuptiales noires sur le pouce aux pattes avant ?

Ventre gonflé avant la ponte, taille max 8,5 cm.

oui

C'est une femelle.

non

C'est un immature.

oui

C'est un mâle, taille 4,5 à 8,5 cm.

non

Ventre gonflé avant la ponte, taille 7 à 15 cm.

oui

C'est une femelle.

non

C'est un immature.



En cas de doute, merci de photographier l'animal, de dessus, de dessous, de face, de profil et de mesurer sa longueur totale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CM



CLÉ DE DÉTERMINATION DES AMPHIBIENS AYANT UNE QUEUE À L'ÉTAT ADULTE (Urodèles).

